

Irodalom: BALÁS, G. és SÁRINGER, Gy. (1982): Kertészeti kártevők. - Akadémiai Kiadó, 1069 pp. - ENDRÓDI, S. (1961): Ormányosbogarak I. - Curculionidae I. - In: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae), X, 4. - Akadémiai Kiadó, Budapest, 77 pp. - FRIESER, R. (1981): 7. Unterfamilie: Otiorhynchinae. - In: Freude, H., Harde, K.W., Lohse, G.A. (eds): Die Käfer Mitteleuropas, 10. Goecke und Evers, Krefeld: 184-240. - JABLONOWSKI, J. (1895): A szőlő betegségei és ellenségei. - K. M. Természettudományi Társulat, Budapest, 296 pp. - KADÓCSA, Gy. (1923): Konyhakerti növényeink állati ellenségével. - Légrády Testvérek Kiadása, Budapest, 122 pp.

Dr. MÉRKL Ottó és TUSNÁDI Csaba Károly, Budapest

Folia ent. hung. 46 (1), 1985

## Új fajok Magyarország bogárfaunájában (Coleoptera)

New species in the Coleoptera fauna of Hungary

Elsősorban a Bakony és az Alpokalja faunakutatása során - az elmúlt három évben - jelentős eredményeket értünk el. Röviden ismertetjük azokat a bogárfajokat, melyek faunánkban eddig még nem voltak ismertek. A fajok többségének magyarországi előfordulása várható volt, ezért a Magyarország Állatvilága sorozat faunafüzeteiben zárójelben megtalálhatók. A Dorytomus nordenskjöldi Faust, az Acalles suturatus Dieckmann és a Lixus scabricollis Bohemann fajok magyar irodalomban még nem szerepeltek.

### CURCULIONIDAE

Dorytomus nordenskjöldi Faust 1883 - Fenyőfő, Kisszépalmapuszta, 1983.IV., X. (kopogtatva Populus tremula L.) leg. Podlussány Attila; Csesznek, Ördögárok, 1983.V. (kopogtatva Populus tremula L.) leg. Podlussány Attila. - A Természettudományi Múzeum Állattárának bogárgyűjteményében más fajok közé keveredve egy Pécsről és egy Tátraszéplakról származó példányt találtam.

Magdalis caucasica Tourmier 1872 - Fenyőfő, Kék hegy, 1983.V. leg. Podlussány Attila. - Az európai elterjedésű fajt faunaterületünkön eddig csak Szlovákiából (Trencsén, Munkács) és a Bán-ságból ismertük.

Magdalis linearis Gyllenhal 1827 - Szalafő, 1980.VI. leg. Podlussány Attila; Fenyőfő, 1982. VI. leg. Oszonics István; Nagyrákos, 1983.V. leg. Podlussány Attila. - A Kárpát-medencében eddig csak Szlovákiában gyűjtötték.

Acalles suturatus Dieckmann 1981 - Balinka, Kisgyömbánya, 1981. IV. (rözszeketegből kopogtatva) leg. Podlussány Attila; Pálmza, 1955.IX. leg. Kaszab Zoltán és Székessy Vilmos; Nagyvisnyó, 1956.VI. leg. Kaszab Zoltán és Székessy Vilmos; Pécs (?), leg. Kaufmann.

Lixus scabricollis Boheman 1843 - Elek, 1964.V. leg. Deseő Katalin; Kétegyháza, 1978.V. leg. Podlussány Attila.

Ceutorrhynchus pectoralis Weise 1895 - Lesenceistvánd, 1974.IV. leg. Kasper Ágota; Cinkota, 1977.IV. leg. Orosz András; Csesznek, Ördögárok, 1982.V., 1983.V. leg. Podlussány Attila; O-laszfalu, Malomréti-völgy, 1982.V. leg. Podlussány Attila; Zirc, Szarvaskút, 1983.V. leg. Podlussány Attila. - A Kárpát-medencében még nem gyűjtötték.

Ceutorrhynchus pervicax Weise 1883 - Nagyrákos, 1982.V. leg. Podlussány Attila. - A Kárpát-medencében ezidáig csak Erdélyben gyűjtötték.

### ATTELABIDAE

Deporaus mannerheimi (Hummel 1823) - Fenyőfő, 1982.VI. (nyirfáról kopogtatva) leg. Markó Viktor. - Faunaterületünkről eddig csak Szlovákiából voltak adataink.

### ANTHRIBIDAE

Paramesus tessellatus Boheman 1829 - Sáska, Agártető, 1967.V. leg. Papp Jenő; Bakony -

szentlászói, 1981.VI. leg. Szalóki Dezső. - A Kárpát-medencében eddig csak Szlovákiában, a Keleti-Kárpátokban és Erdély lomberdős területein gyűjtötték.

Choragus horni Wolflm - Baltnka, Kisgyónbánya 1981.VI. (rözszeketegből kopogtatva) leg. Podlussány Attila. - Faunaterületünkön eddig csak Szlovákiából és Horvátországból voltak adataink.

#### SCOLYTIIDAE

Taphrorychus hirtellus Eichhoff 1879 - Vérteskozma 1968.VII. leg. Dr.Nagy Barnabás. - ENDRÓDI (1958) Balatonedericsről és Siófokról is említi, a faunafüzetben azonban zárójelbe került a faj, a csak Szlovákiából és Horvátországból említi.

Pityophthorus carniolicus Wichmann 1910 - Fenyőfő, 1983.V. leg. Podlussány Attila; Szalafő, 1983.V. leg. Podlussány Attila. - Az Alpokból és Csehországból ismert faj.

Pityophthorus balcanicus Pfeiffer - Fenyőfő, 1983.V. leg. Podlussány Attila. - Ezt a fajt SCHEDL (1981) a Pityophthorus henscheli Seitn. faj synonimájaként tárgyalja, de ezt sem gyűjtötték még Magyarországon. Az Alpokból és a Balkán félszigetről volt ismert.

Pityogenes bistridentatus Eichhoff.1879 - Zalahaláp, Ujdörögő, 1964.III. (Pinus silvestris L. kérgéből) leg. Podlussány Attila; Nagyvázsony, Kab-hegy, 1982.IV. leg. Podlussány Attila; Balatonfüred, Koloska-völgy, 1980.V. leg. Podlussány Attila; Bakonyszűcs, 1983.V. leg. Podlussány Attila; Fenyőfő, 1983.V. leg. Podlussány Attila. - A végére hagytam az egyetlen már publikált adatot, mely ellent mond a faunánkra új állításnak: Tihany 1941.V. leg. Kaszab Zoltán és Székessy Vilmos. Ez az adat ugyanis a Pityogenes conjunctus Reitter név alatt szerepel a faunafüzetben, bár Reitter a P. bistridentatus Eichh. faj változatának (ab. conjunctus) tartotta. Valószínűleg ezért a fent említett nyugatnémet irodalom a conjunctus nevet synonimként említi.

Pityogenes bidentatus Herbst 1783 - Nagyrákos, 1982.V. leg. Podlussány Attila; Szalafő, 1982.V., leg. Podlussány Attila; Hegyhátszentjakab, Vadása-tó, 1982.V. leg. Podlussány Attila; Farkasfa, 1983.V. leg. Podlussány Attila; Óriszentpéter, Bárkás-tó, 1983.V. leg. Podlussány Attila. - A Kárpátok vonulatán mindennél előfordul.

Leperisinus orni Fuchs 1906 - Bakonyszentkirály, Zörögтетő, 1983.IV. leg. Szalóki Dezső; Bakonybél, Gerence-völgy, 1983.V. leg. Podlussány Attila. - A faunafüzetben a Hylesinus genusba sorolt fajt FREUDE, HARDE és LOHSE (1981) a Leperisinus varius Fabricius synonimájaként említi.

#### NITIDULIDAE

Epuraea distincta (Grimmer 1841) - Olaszfalu, Malomréti-völgy, 1982.III. (talajrostálás) leg. Rozner István és Podlussány Attila; Zebegény, Malom-völgy, 200 m. patak völgy, Trametes-ről, 1982.IV.6. leg. Merkl Ottó. - A Kárpát-medencében csak az Északi-Kárpátokból és Horvátországból volt ismert egy-egy adat. Fák kérge alatt gombákon, taplókon él.

#### MORDELLIIDAE

Mordellaria aurofasciata (Comoli 1837) - Nyírád, Felsőnyírádi-erdő, 1979.VII. leg. Podlussány Attila. - Faunaterületünkön eddig csak Horvátországból, a Keleti-Kárpátokból, Erdélyből és a Bánságból került elő.

Mordellochroa milleri (Emery 1876) - Bakonyszűcs, Kőrös-hegy, 1977.VII. leg. Podlussány Attila; Némethbánya, 1982.VIII. leg. Kalivoda - E ritka fajt eddig csak a Bánságból, a Keleti-Kárpátokból és Ausztriából ismertük.

#### CANTHARIDAE

Rhagonycha banatica (Rosenhauer 1847) - Balaton-felvidék, Ábrahám-hegy, 1976.VII. leg. Ádám László. - Faunaterületünkön a Délkeleti- és Déli-Kárpátokból, valamint Horvátországból voltak adataink.

#### MELANDRYIDAE

Orchesia grandicollis Rosenhauer 1847 - Fenyőfő, Kék-hegy 1982.XI. (rözszeketeg alól talajrostálással) leg. Podlussány Attila és Rozner István, 1983.V. (gombás gallyról kopogtatva) leg. Szalóki Dezső. - Előfordul Ausztriában, Sziléziában, Erdélyben és Horvátországban.

Melandrya barbata (Fabricius 1792) - Fenyőfő, Kék-hegy 1983.V. (fényre repült) leg. Podlussány Attila és Szalóki Dezső. - Faunaterületünkön a Kárpátokban és Horvátországban gyűjtötték.

Az itt felsorolt fajok bizonyíté példányai a Természettudományi Múzeum Állattára, a Bakonyi

Természettudományi Múzeum és a Savaria Múzeum bogárgyűjteményében, valamint Podlussány Attila és Szalóki Dezső magánygyűjteményében találhatóak.

Irodalom: ENDRÓDI S. (1958): A szubogarak (Scolytidae) Kárpát-medencei lelőhelyadatai. - Folia ent. hung., 11: 21-43. - SCHEDL, K.E. (1981): Familie, Scolytidae. - In: Freude, H., Harde, K.W., Lohse, G.A.: Die Käfer Mitteleuropas, 10: 58-85.


CZETŐ Zsolt  
PODLUSSÁNY Attila  
SZALÓKI Dezső, Budapest

Folia ent. hung. 46 (1), 1985

## Az *Euzophera bigella egeriella* Milliére hazai előfordulása őszibarackfákon (Lepidoptera: Phycitidae)

The occurrence of *Euzophera bigella egeriella* Milliére in Hungary on peach trees  
(Lepidoptera: Phycitidae)

1981. őszén a Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató Intézet érdei kísérleti telepének őszibarack ültetvényében a kéregelhalást okozó gombák által keltett sebeket megbontva rovarjáratokat figyeltünk meg, amelyek főleg az elpusztult kéregrészekben haladtak, de helyenként behatoltak a még élő hánccsa is. A járatok egy részéből a "tettes", egy körülbelül 1,5 cm hosszúságú hernyó is előkerült. E hernyók közül kettőt sikerült kinevelni, és azok az *Euzophera bigella egeriella* Mill. példányainak bizonyultak. (Az egyik példányról készült genitália rajzot GOZMÁNY Lászlóval hasonlítottuk össze ROESLER (1973) *Euzophera* genitália rajzaival, és azt az ott *E. egeriella* Mill. néven szereplő fajával találtuk egyezőnek, a másik példányt R.U. ROESLER az *E. bigella bigella* és *E. bigella egeriella* közti átmeneti formának határozta meg.)



1. ábra: Az *Euzophera bigella* him ivarszerve; a - transtilla, b - edeagus

Az *E. bigella* Z. és *E. egeriella* Mill. - korábban különállónak tekintett - fajok státusát ROESLER (1980) tisztázta; megállapította, hogy egy faj két alfajáról van szó. A két alfaj elsősorban a him genitália transtillája és edeagusa alakulásában különbözik egymástól. Amíg a *ssp. bigellánál* tipikus esetben a transtilla patkó alakú, az edeagus vége pedig nem szélesedik ki, addig a *ssp. egeriella* esetében a transtilla járom alakú, az edeagus vége pedig egyik oldalon mintegy peremet viselve kiszélesedik. A két alfaj közül a *ssp. bigella* Európa középső zónájában, a *ssp. egeriella* Dél-Európában, Észak-Afrikában és Kisázsiaiban él, a két terület között pedig egy viszonylag széles kereszteződési zóna található. E kereszteződési zóna északi határát ROESLER nagyjából a 46° szélességi kör mentén vonta meg. Az érdei példányok azt igazolják, hogy ez a zóna, ahol a két alfaj tipikus alakjai és átmeneti formái is előfordulnak, nálunk a 47° szélességi körtől északra is kiterjed. Az *E. bigella egeriella* alfaj magyarországi előfordulásáról ezideig konkrét adat nem volt ismeretes, az őszibarack sem szerepelt eddig ismert tápnövényei között.